

Ficha Técnica de Produto: FRUITMAX 10

Referência: FC0232A

TEORES DECLARADOS

Azoto (N) total	3,46% p/v	3,0% p/p
Azoto (N) orgânico	3,34% p/v	2,9% p/p
Óxido de potássio (K ₂ O) solúvel em água	1,96% p/v	1,7% p/p
Boro (B) solúvel em água	1,15% p/v	1,0% p/p
Molibdénio (Mo) solúvel em água	0,11% p/v	0,1% p/p
Aminoácidos livres	11,55% p/v	10,0% p/p
Extracto de algas	9,40% p/v	

CLASSIFICAÇÃO

7.2. Outros adubos e produtos especiais. Adubo com aminoácidos NP 3-1,7.

Classe A - Teor de metais pesados inferior ao limite admissíveis para esta classificação (RD 506/2013 como norma de aplicação do Regulamento (CE) N.º 2003/2003).*

**Excepto nos que são parte constituinte da formulação.*

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Aparência	Solução escura
Estado físico:	Líquido
Cor:	Castanho-escuro
Densidade (kg/l)	1,16 ± 0,01
pH	7,4 ± 0,5
Solubilidade	Totalmente solúvel em água

PROPRIEDADES.

O Fruitmax 10 é um produto líquido bioestimulante à base de aminoácidos, biomoléculas, osmólitos e extratos de algas especialmente concebido para ser aplicado durante a fase de crescimento vegetativo e

Versão 3 de 03-07-2018

SEDE OLHÃO
morada Parque Hubel, Pechão,
8700-179 Olhão
tel 289 710 515 fax 289 710 516

ALPIARÇA
morada Zona Industrial, lotes 55 e
56, 2090-242 Alpiarça
tel 243 557 606 fax 243 557 607

FERREIRA DO ALENTEJO
morada Parque Empresas, 16 e 30
7900-571 Ferreira do Alentejo
tel 284 739 612

hv@hubel.pt
www.hubelverde.com



PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSessorIA
AGRONÓMICA A CONDUÇÃO DE CULTURAS

em momentos específicos da floração, frutificação e engorda do fruto como promotor da multiplicação celular.

A sua aplicação periódica, como complemento de uma fertilização adequada, permite o equilíbrio vegetativo e é fonte de energia para a planta, ideal para maximizar o calibre e uniformidade dos frutos, bem como o rendimento global da cultura.

DOSAGENS E MODO DE UTILIZAÇÃO

O Fruitmax 10 é um bioestimulante totalmente solúvel em água, ideal para a aplicação foliar do produto, que também pode ser aplicado via fertirrega. A sua aplicação é recomendada em todos os tipos de culturas como hortícolas, fruteiras, citrinos, vinha, olival, ornamentais, culturas industriais e cereais.

- Foliar:

Aplicar 1,5 - 2,5 l/ha em 2 aplicações ao longo do ciclo cultural, em especial na fase de engorda do fruto.

- Fertirrega:

3 - 5 l/ha, com aplicação a cada 7 - 10 dias.

OBSERVAÇÕES

O Fruitmax 10 não está sujeito a qualquer consideração toxicológica, tanto de transporte como armazenamento.

O produto é compatível com a maioria dos produtos químicos utilizados na agricultura. No entanto, é sempre recomendado realizar um teste prévio de compatibilidade.

Aplicar sob assessoria técnica agronómica.

Ler atentamente o rótulo antes de utilizar.

Armazenar em local fresco e seco.

Temperatura de armazenamento óptima: entre 5 e 30°C.

Não empilhar mais de três vasilhas ou cinco caixas de altura.

P102: Manter fora do alcance das crianças.

P270: Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.