

Ficha Técnica de Produto: SYMBOSOIL

Referência: FT-00323

COMPOSIÇÃO

Sacarose 10 g/kg

CLASSIFICAÇÃO

Sacarose. Substância básica.

Regulamento (CE) N.º 1107/2009

Classe II - Teor de metais pesados inferior ao limite admissíveis para esta classificação (Decreto-Lei N.º 103/2015, Anexo II).

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Formulação	Pó molhável (WP)
Estado físico	Sólido
Cor	Verde

PROPRIEDADES

O Symbosoil consiste numa formulação sólida à base de sacarose que pode ser usado tanto por via foliar como radicular, que actua como indutor e potenciador dos mecanismos naturais de resistência da planta contra o *stress* causado por factores bióticos e abióticos. Possui uma acção directa sobre a planta pois activa mecanismos de defesa fisiológicos e bioquímicos relacionados com os mecanismos de resistência induzida e adquirida (RSI e RAS), com a destoxificação de toxinas excretadas por patogénicos e a desactivação de enzimas durante o processo de infecção.

O Symbosoil activa o sistema de resistência das plantas e incrementa a actividade metabólica, cuja função melhora a capacidade de assimilação de água e nutrientes necessários para um aumento significativo de biomassa, vigor e rendimento produtivo, além de agir sinergicamente através de diferentes mecanismos com efeitos directos tanto no patogénico como na planta hospedeira.

O Symbosoil promove também a solubilização de elementos nutritivos, que na sua forma original não são acessíveis às plantas e possui a capacidade de criar um ambiente favorável para o desenvolvimento de raízes, o que aumenta a tolerância da planta ao *stress*.

Versão 1 de 07/04/2020

SEDE OLHÃO
morada Parque Hubel, Pechão,
8700-179 Olhão
tel 289 710 515 fax 289 710 516

ALPIARÇA
morada Zona Industrial, lotes 55 e
56, 2090-242 Alpiarça
tel 243 557 606 fax 243 557 607

FERREIRA DO ALENTEJO
morada Parque Empresas, 16 e 30
7900-571 Ferreira do Alentejo
tel 284 739 612

hv@hubel.pt
www.hubelverde.com



DOSAGENS E MODO DE UTILIZAÇÃO

Aplicar Symbosoil na dose prescrita numa pequena quantidade de água ou diluir na mesma embalagem se for usado completamente, agitando a mistura e juntando-se posteriormente ao tanque de aplicação.

Aplicar o produto no menor tempo possível, agitando a mistura periodicamente. Recomenda-se aplicar de preferência pela manhã antes das 9h e evitar a perda por excesso de drenagem nos primeiros dois dias após a aplicação do produto.

BATATA

Aplicar 1,5 kg/2500 kg de batata de semente.

HORTÍCOLAS

- *Aplicação foliar* - 100 g/100 l.
- *Fertirrega* - Aplicar por rega gota-a-gota, em tratamentos escalonados, o primeiro com 1 kg/ha e os sucessivos com 0,5 kg/ha numa quantidade de água suficiente, em intervalos de 15 - 30 dias. A primeira aplicação deve realizar-se no transplante, mas pode ser atrasada até aos 15 dias seguintes ao mesmo se existir pouco enraizamento. A dose acumulada não deve ultrapassar os 3 kg/ha.

MAÇÃ (*Malus pumila*, *Malus domestica*)

Aplicação foliar desde a rebentação até à floração à razão de 100 g/100 l. Realizar 7 a 10 aplicações a intervalos de 10 dias.

MILHO

Aplicação foliar à razão de 100 g/100 l desde a 2ª folha livre até ao aparecimento da bandeira. Realizar 3 a 4 aplicações a cada 15 dias.

MORANGO

- *Aplicação foliar* - 0,5 kg/ha desde a floração, com repetições a cada 15 dias.
- *Fertirrega* - Aplicar em rega gota-a-gota num total de 6 tratamentos por campanha.
 - Aplicações pós-transplante: 1 kg/ha, 3 tratamentos. O primeiro no momento do transplante ou próximo (2 - 3 semanas) e os restantes após 21 dias.
 - Aplicações na Primavera: no máximo 3 tratamentos (1 kg/ha) por rega gota-a-gota, com um intervalo de aplicação de 15 - 20 dias.

Realizar os tratamentos na última fase da rega para evitar perdas de produto. A dose acumulada (soma de todas as aplicações) não deve superar os 6 kg/ha.

SEMENTEIRA

- Aplicar em pulverização directa na bandeja em diluições de 200 g/100 l.
- Aplicar na mistura com o substrato à dose de 0,25 kg/m³ de substrato.

VIDEIRA E UVA DE MESA, NECTARINA, PÊSSEGO

Aplicação foliar à razão de 250 - 500 g/100 l desde a floração, repetir a cada 15 dias.

OBSERVAÇÕES

Não misturar com cobres, ácidos, nem produtos fortemente alcalinos. Não deve ser usado no cultivo de *champignon* ou outros cogumelos comestíveis. Para misturar com fungicidas consultar o Departamento Técnico da Hubel Verde. Para misturas com outros pesticidas, surfactantes ou fertilizantes, recomenda-se realizar um teste prévio de compatibilidade.

Utilizar de preferência antes de 12 meses após data de fabrico.

Armazenar em local fresco e seco.

Temperatura de armazenamento óptima: 5 a 35°C.

Não empilhar mais de três vasilhas ou cinco caixas de altura.

- P101 Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.
- P102 Manter fora do alcance das crianças.
- P501 Eliminar o conteúdo e/ou recipiente por meio do sistema de recolha selectiva em vigor.